

LA DERMATITE À LEVURES CHEZ LE CHIEN

Service de dermatologie, Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire,
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal.

La dermatite à levures est une infection des couches superficielles de la peau causée par une levure (un champignon) nommée *Malassezia pachydermatis*. Cette levure n'est pas contagieuse pour les humains ou les autres animaux. Il s'agit d'un habitant normal de la peau qui, dans certains cas se multiplie en beaucoup plus grand nombre que la normale et cause ainsi des problèmes.

Signes cliniques

Si votre chien souffre d'une dermatite à levures, il peut présenter un ou plusieurs des symptômes suivants: démangeaisons, mauvaise odeur corporelle, rougeurs, perte de poils, pelage grasseyé avec ou sans pellicules jaunes ou brunâtres.

La dermatite à levures peut être localisée à certains endroits comme les oreilles, les espaces entre les orteils, le menton, le cou, le ventre, autour de l'anus et les aisselles. Dans d'autres cas, la dermatite à levures peut être d'emblée généralisée, affectant plusieurs de ces endroits simultanément ou de grandes surfaces de peau.

Traitement

Le traitement de la dermatite à levures comprend deux options :

Traitement topique

Des pommades ou rinçes, appliquées sur la peau, une ou deux fois par jour pour une durée minimale de trois semaines, peuvent être utilisées lors de dermatite à levures est localisée. Les shampooings antifongiques peuvent également aider à contrôler la dermatite à levure localisée ou généralisée.

Traitement systémique

L'administration d'un antifongique (kétoconazole ou itraconazole) par voie orale, deux fois par jour pour un minimum de trois

semaines, est utilisé dans les cas où la dermatite à levures est étendue et/ou grave ou lorsque le traitement topique se révèle peu pratique. Ce traitement doit être prolongé au moins une semaine après la guérison apparente de la dermatite.

Pourquoi votre chien souffre-t-il d'une dermatite à levures ?

Le plus gros problème relié à la dermatite à levures est souvent de trouver le pourquoi. Plusieurs maladies sous-jacentes peuvent être mises en cause, telles les allergies ou les parasites ou encore un dérèglement au niveau de la peau dû à des problèmes d'hérédité, de mauvaise nutrition ou d'hygiène.

Une fois la dermatite à levures identifiée, il faut la traiter avec un antifongique, et ce, quelle que soit la cause sous-jacente. En fait, ce n'est qu'une fois la dermatite à levures guérie qu'il sera possible de déterminer s'il y a encore présence de démangeaisons, de rougeurs ou autres. Si tel est le cas, il sera alors important d'identifier cette maladie sous-jacente. Si non, le problème récidivera tôt ou tard et le traitement antifongique devra être recommencé.

Il est parfois nécessaire de combiner un traitement antifongique (anti-levures) avec un traitement antibiotique (anti-bactéries). En effet, ces deux types d'infection de peau peuvent se retrouver en même temps chez votre animal.

Ce n'est que récemment que la dermatite à levures a été reconnue chez le chien. Beaucoup d'énigmes demeurent à ce sujet. Toutefois le traitement reste simple et efficace (même s'il est parfois long et coûteux). Le plus compliqué, mais souvent le plus rentable à long terme, demeure d'identifier la cause sous-jacente, le cas échéant.